

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACI  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ  
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACI СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ  
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACI ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ВАЗИРЛИГИ  
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ**

---

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
МИНИСТЕРСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**



**“ПРОФИЛАКТИК ТИББИЁТДА  
ЮҚОРИ ИННОВАЦИОН  
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ”**

**мавзусидаги республика  
илмий – амалий анжумани**

**МАТЕРИАЛЛАРИ**

**АНДИЖОН – 2020 йил**

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**Научный редактор -** Мадазимов М.М., доктор медицинских наук, профессор

**Ответственный редактор -** Ходжиматов Г.М., доктор медицинских наук, профессор

**Члены редакционной коллегии -** Нишонов Ф.Н., Салохиддинов З.С., Мамасолиев Н.С., Арзикулов А.Ш., Турсунов Х.Х., Асранкулова Д.Б., Худайбердиев К.Т., Салохиддинов К.З., Кузибаева М.М., Маматхужаева Г.Н.

**Редакторы по компьютерной графике -** Утанов З.М., Жохонгиров Ж.А., Абдурахмонов С.Х., Бустанов Ш.Я., Бекташев И.Б.



*Тезисы не рецензируются. За содержание и достоверность указанной информации ответственность несут авторы*

Полипоз этмоидит каби сурункали касалликни даволаш самарасини баҳолашда биринчи ўринга рецидивсиз даврнинг давомийлиги чиқади. Бурун бўшлиғи адренализациясидан сўнг, текшириб кўрилганда бурун ўрта йўлида полипларнинг аниқланиши рецидив ҳолати деб қайд қилинди. Рецидивлар энг кам 4 даволаш гуруҳида кузатилган – 2 беморда 9 ойдан сўнг, 5 беморда, 18 ойдан сўнг ва 8 беморда, 27 ойдан сўнг қайталанган. Бироқ 1 даволаш гуруҳида 9 ойдан сўнг рецидив 5 беморда, 18 ойдан сўнг – 7 ва 27 ойдан сўнг – 17 беморда аниқланган. Барча беморларнинг ўрта ҳисобида 9 ойдан сўнг 14 беморда, 18 ойдан сўнг – 24 беморда, 27 ойдан сўнг – 51 беморда рецидив кузатилган. 2 ва 3 гуруҳ кўрсаткичлари тадқиқотдаги беморларнинг ўртача кўрсаткичларига тўғри келган.

ПРС рецидиви ускуна ёрдамида ва лаборатория таҳлиллари билан тасдиқланган ПРС 4 гуруҳ беморлари бурун бўшлиғи, икки томонлама бурун ва ғалвирсимон лабиринт соҳасига навбатдаги 10 сеансдан иборат фотолинмик полилазертерапия курсидан сўнг, бурун бўшлиғини эндоскопик текширилди, ва полипоз тўқима ҳажмининг кичрайиши – ПРС инволюцияси кузатилди.

**Хулоса.** Биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва тақлиф этилаётган услуб самарали, амалга оширишга қулай ва ижобий натижаларга эга бўлгани сабабли оториноларингологиянинг даволаш амалиётига жорий этилишига тавсия қилинади. Полипоз этмоидитнинг даволашнинг ушбу услубини қўллаш орқали бурун бўшлиғи функциялари тезроқ тикланиши ва беморларнинг цитокин статуси тезроқ меъёрга келиши кузатилган сабабли қайталаниш даври ишончли тарзда узайиши организмга яхши таъсир этмай қолмайди.

## К ВЫБОРУ ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ

*Алсимаматов Х.Т., Миракаримов Б.Х., Тошбоев Ш.О., Тошматов Х.З.  
Андижанский государственный медицинский институт*

**Актуальность.** Атрезия пищевода (АП) представляет собой врожденный порок развития, встречающийся в практике педиатра и детского хирурга и требующий своевременной диагностики и неотложной хирургической коррекции. Частота его составляет 1 : 3000 новорожденных. Наиболее частым вариантом данного порока (88%) является атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом. Несмотря на то, что в лечении больных с АП имеются значительные достижения, до сих пор остается много нерешенных проблем, в том числе и технических, а летальность в ведущих детских хирургических центрах Узбекистана от данного порока составляет 20-40 %.

**Цель.** Оценка эффективности методов диагностики и хирургического лечения атрезия пищевода у новорожденных.

**Материал и методы.** В клинике неонатальной хирургии АОДМПМЦ с 2018 г. по 2019 год находились на лечении 14 новорожденных с атрезией пищевода. Абсолютное большинство детей поступили в клинику в поздние сроки. Так, в первые сутки после рождения поступило 5 (35,7 %) детей, из них трое после первого кормления; на вторые - 7 (50 %); на третьи – 2 (14,3 %). Мальчики составили 71,4%. В большинстве случаев (85,7 %) встречалась атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом, причем в 2-х - в области бифуркации трахеи. У половины детей имелась недоношенность 1-2 ст., и практически все дети поступали с клиникой аспирационной пневмонии, тяжесть которой зависела от срока диагностики атрезии пищевода. Сочетанные пороки развития выявлены у 3 новорожденных и включали в себя аномалии желудочно-кишечного тракта, порок сердца и синдром Дауна. В преоперационном периоде параллельно со стабилизацией функции жизненно важных органов в условиях реанимационного отделения хирургического стационара, для подтверждения диагноза проводилось зондирование пищевода и желудка с последующим рентгенологическим исследованием с использованием водо- или жирорастворимых контрастных веществ в количестве 0,5 – 1 мл и аспирацией контраста после исследования. Эффективность проводимой интенсивной терапии оценивалась по стабилизации общего состояния ребенка и гемодинамики, восстановлению диуреза и уменьшению степени дыхательной недостаточности. Подготовка продолжалась в течение одних или двух суток в зависимости от состояния ребенка.

**Результаты исследования и их обсуждение.** Выбор метода хирургического лечения АП мы определяли в зависимости от вида аномалии. Оперативный доступ - экстраплеврально в 3-м межреберье справа, что предотвращает при частичной несостоятельности анастомоза вовлечение легких и плевральной полости в воспалительный процесс. После обнажения заднего средостения обнаруживалась и лигировалась v. azygos, поскольку она «перекидывается» через пищевод и трахею вблизи места деления трахеи на бронхи и затрудняет наложение анастомоза. Данная вена при этом служила и ориентиром для нахождения трахео-пищеводного свища. Далее мобилизовался гастральный сегмент пищевода до места впадения в трахею. Обнаружению орального сегмента способствовало введение зонда в пищевод. При мобилизации атрезированных отделов пищевода важнейшим условием успеха операции мы считаем сохранение внутривенозного кровоснабжения нижнего сегмента и снижение степени ишемии зоны анастомоза, что достигалось минимальной мобилизацией гастрального отдела пищевода. Помимо вышеизложенного, манипуляции в ране осуществлялись после нахождения, сохранения и бережного обращения с блуждающим нервом, что предупреждало нарушение иннервации и перистальтики пищевода в послеоперационном периоде. Наконец, следующей актуальной задачей являлось точное разграничение между диспластическими тканями трахео-пищеводного свища и непосредственно пищеводом. При выделении концов пищевода, в первую очередь, лигировалась трахео-пищеводный свищ. Наложение первичного анастомоза удалось выполнить во всех случаях, так как протяженность диастаза между сегментами пищевода варьировала от 0,5 до 2 см. В течение последних пяти лет мы отказались от наложения двухрядного шва анастомоза. В настоящее время накладываем анастомоз по типу «конец в конец» однорядным швом с использованием атравматического шовного материала (викрил 6/0). Во время наложения анастомоза в желудок вводится назогастральный зонд для последующего более раннего энтерального питания. Операция заканчивалась постановкой страхового дренажа в заднее средостение и послойным ушиванием раны. В раннем послеоперационном периоде у 3-х (21,4%) больных на фоне прогрессирующей аспирационной пневмонии была диагностирована несостоятельность анастомоза с развитием гнойного медиастинита, что послужило причиной их летального исхода. В послеоперационном периоде дети при гладком течении к концу 5-7 суток начинали получать

энтеральное питание через зонд. На 11-14 сутки заведенный в желудок во время операции зонд меняли на больший с последующим рентгенологическим исследованием для оценки состоятельности анастомоза. Начиная с 12-13 суток для предупреждения стенозирования зоны анастомоза проводили профилактическое бужирование пищевода, которое продолжали до выписки больного из стационара. Отдаленные результаты прослежены в сроки от 1 года до 5 лет у 11 больных (78,6%). У 3-х выявлено стенозирование анастомоза, что послужило показанием к повторному бужированию с положительным клиническим эффектом. Данный факт указывает на необходимость активного диспансерного наблюдения данной группы больных.

**Выводы.** Таким образом, в настоящее время атрезия пищевода - это безусловно корригируемый порок развития с достаточно высокой частотой встречаемости в Андижанском регионе. Принятый в клинике комплекс диагностических и лечебных мероприятий показал свою эффективность и позволяет рассчитывать на успех хирургического лечения атрезии пищевода у новорожденных.

## ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

*Азизов Д.Т., Мирзаев К.К., Умурзаков С.К., Жураев Г.Г.  
Андижанский государственный медицинский институт*

Проблема профилактики и лечения гнойных осложнений после огнестрельных ранений конечностей является актуальной. Достаточно сказать, что у раненных с нарушением целостности костей огнестрельный остеомиелит встречался 21,9 %– 60% наблюдений. Широкое применение огнестрельного оружия привело к увеличению количества тяжелых ранений. Однако остается актуальной проблема профилактики и лечения гнойных осложнений после огнестрельных ранений.

**Цель исследования.** Провести изучение эффективности лимфотропной терапии (ЛТ) с региональной лимфостимуляцией (РЛС) в комплексе интенсивной терапии огнестрельных переломов костей конечностей.

Под нашим наблюдением находились больные с огнестрельными переломами костей конечностей. Возраст пострадавших колебался от 15 до 52 лет. При поступлении всем раненым проводили лабораторные исследования: общий анализ крови, мочи, биохимия крови, иммунологические, цитологические исследования, рентгенография поврежденной конечности. Экстремедуллярный остеосинтез осуществлен у 42,5% больных (I группа), внеочаговый – у 57,5% (II группа). У 34% больных огнестрельные переломы локализовались на верхней конечности, у 66% - на нижней конечности. Контрольную группу составили 42,5% больных и 57,5% - основную.

В контрольной группе в послеоперационном периоде антибактериальная терапия проводилась традиционным способом, в основной группе – ЛА с РЛС.

В I группе предложенная методика позволила добиться заживления ран первичным натяжением у 93,8% больных. Длительность пребывания в стационаре составила  $8,7 \pm 0,3$  дня, тогда как в контрольной группе эти сроки составили  $31,5 \pm 1,3$  дня ( $P < 0,01$ ).

У 6,2% больных воспалительный процесс ограничился в пределах мягких тканей и в виде огнестрельного остеомиелита (6,2%). В контрольной группе нагноение мягких тканей отмечено у 20%, развитие остеомиелита – у 13,3% раненых.

В комплексном лечении огнестрельных переломов у больных с обширными повреждениями мягких тканей (II группа) в основной группе мы применили внеочаговый остеосинтез и ЛА с РЛС.

Предложенная методика позволила нам 30,7% больным наложить первично-отсроченные швы на  $5,1 \pm 0,3$ -и сутки. Длительность пребывания в стационаре составила  $11,3 \pm 0,4$  дня. Раны в целом зажили за  $16,5 \pm 0,6$  дня, тогда как в контрольной группе эти сроки составили  $24,9 \pm 1,9$  дня ( $p < 0,05$ ). В основной группе осложнения отмечены у 7,7% больных в виде воспаления мягких тканей и остеомиелита у 3,8%. В контрольной группе нагноение мягких тканей наблюдалось у 18,5% и остеомиелит у 12,5% раненых.

Таким образом, использование ЛА и РЛС в комплексе интенсивной терапии огнестрельных переломов конечностей позволило у раненых применить первичный экстремедуллярный остеосинтез и при обширных повреждениях мягких тканей внеочаговый остеосинтез с минимальными инфекционными осложнениями.

## КОМПЛЕКСНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ГАНГРЕНЫ СТОПЫ

*Азизов Д.Т., Мирзаев К.К., Хайдаров М.О., Жураев Г.Г.  
Андижанский государственный медицинский институт*

Лечение гнойно-некротических процессов невозможно без учета тяжести сахарного диабета, вида инфекции, фазы и локализации воспалительного процесса, особенностей общих и местных проявлений, обусловленных свойствами возбудителей и реактивности организма больного.

Нами проанализированы результаты лечения 64 больных с гнойно-некротическим поражением стопы, развившимися на фоне сахарного диабета. Все больные были с тяжелой степенью тяжести сахарного диабета. Качественный состав микрофлоры, выделенный из биопатов ран, показал, что среди выделенных микробов наиболее часто встречался стафилококк - в 84,6 %. В 42,6% выделены неклостридиальные анаэробные микроорганизмы.

У 20 больных с гнойно-некротическим поражением стопы была изолированная гангрена одного или нескольких пальцев, протекавшая чаще по влажному типу с сохранением пульсации на артериях голени. Нередко выявление пульсации было возможным лишь после устранения отека местных тканей. Прогрессирующая диабетическая влажная гангрена (у 22 больных) развивалась при тромбозе магистральных артерий, для неё была характерна высокая интоксикация. При этом наблюдался феномен «взаимного отягощения» - ухудшение течения диабета у 6 больных привело к коматозному состоянию. Гангрена часто сопровождалась повреждением костей, мелких суставов, сухожилий,

Абдукодиров С.А., Маматов Б.Ю., Собиров М.С., Абдуллаев А.С., Эргашев Х.М.	
РАННЕЕ ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДИКТОРАМИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА	636
Абдукодиров С.А., Маматов Б.Ю., Собиров М.С., Абдуллаев А.С., Эргашев Х.М.	
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРАНЕФРИТА	637
Абдулазизов С.А., Рустамов У.М., Садькова Д.И., Бобоев Р.А., Хамраев О.А.	
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МИКСОМ СЕРДЦА	638
Абдулазизова А.Б., Сабиров А.А., Рашидова Ш.У., Муйдинов Ж.И.	
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И ГИСТОГЕНЕЗ МИКСОМЫ СЕРДЦА	638
Абдулазизова А.Б., Сабиров А.А., Рашидова Ш.У., Муйдинов Ж.И.	
ПРОФИЛАКТИКА НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ	639
Абдуллаев А.С., Маматов Б.Ю., Собиров М.С., Қодиров Х.Х., Сайфуддинов С.З.	
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	640
Абдуллаев А.С., Маматов Б.Ю., Собиров М.С., Қодиров Х.Х., Сайфуддинов С.З.	
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА И МОНИТОРИНГ ГЛУБИНЫ АНЕСТЕЗИИ В ЛАПАРАСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ	641
Абдуллаев А.С., Маматов Б.Ю., Собиров М.С., Қодиров Х.Х., Сайфуддинов С.З.	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСЕРВАТИВНОГО И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ	642
Абдуллажанов Б.Р., Нишанов Ф.Н.	
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У СТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ	642
Абдуллажанов Б.Р., Ботиров Ж.А.	
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ	643
Абдуллажонов Х.М.	
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ	643
Абдуллажонов Х.М.	
ВНУТРИОРИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ СИНУСИТАХ	644
Абдумаликов И.М., Юсупов М.М.	
ТАШКИ БУРУННИНГ ТУҒМА ВА ОРТИРИЛГАН НУҚСОНЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ЭНДОНАЗАЛ УСУЛИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ	644
Абдумаликов И.М., Юсупов М.М.	
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	645
Абдурасулов Х.Х., Ахмедов М.М., Тапшматова Ю.Ж., Хакимова Г.Ж.	
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	646
Абдурасулов Х.Х., Ахмедов М.М., Тапшматова Ю.Ж., Хакимова Г.Ж.	
КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯ НУР ДИАГНОСТИКАСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛИ	647
Аблязов А. А., Мадрогимова Б. Х., Якубов Н. И.	
ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЗИТРОННО – ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ	647
Аблязов А.А., Рашидова Ш. У., Рахимова К.М.	
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА	648
Аблязов А.А., Тургунов Ш.Ш., Зулунов А.Т.	
ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ - ОДИН ИЗ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОЙ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ	649
Аблязов А.А., Исломов Р. Д., Тоджиходжаев Ш. Ш.	
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАСЛЕДСТВЕННОГО АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА	649
Абызбаева А. С., Байкосова Г. К.	
ПОЛИПОЗ ЭТМОИДИТЛАРНИ ДАВОЛАШДА ФОТОДИНАМИК ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ	650
Авезов М.И., Якубова Н.Р.	
К ВЫБОРУ ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ	651
Ажидаматов Х.Т., Миракаримов Б.Х., Тошбоев Ш.О., Тошматов Х.З.	
ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОГНЕСТЕРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ	652
Азизов Д.Т., Мирзаев К.К., Умурзаков С.К., Жураев Г.Г.	
КОМПЛЕКСНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ГАНГРЕНЫ СТОПЫ	652
Азизов Д.Т., Мирзаев К.К., Хайдаров М.О., Жураев Г.Г.	
ВОЗМОЖНОСТИ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ТИРЕОИДНОЙ ТКАНИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	653
Алибоев М.Р., Хожиметов Д.Ш., Эгамов С.Ш.	