

**КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ  
ПРЕДЕЛЬНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ****Мамарахмонов Мухаматдин Хомидович**

*PhD, доц., кафедра химии, Андижанский госуниверситет,  
Республика Узбекистан, г. Андижан  
E-mail: [muhamatdin@mail.ru](mailto:muhamatdin@mail.ru)*

**Аскарлов Ибрагим Рахманович**

*д-р хим. наук, проф., кафедра химии, Андижанский госуниверситет,  
Республика Узбекистан, г. Андижан  
E-mail: [stek@inbox.ru](mailto:stek@inbox.ru)*

**Киргизов Шахабиддин Мирзарайимович**

*канд. хим. наук, проф., кафедра химии, Андижанский госуниверситет,  
Республика Узбекистан, г. Андижан  
E-mail: [sh\\_kirgizov@mail.ru](mailto:sh_kirgizov@mail.ru)*

**Ноибжоновна Хуршида**

*ассистент, Андижанский государственный медицинский институт,  
Республика Узбекистан, г. Андижан  
E-mail: [knoibzhonova@mail.ru](mailto:knoibzhonova@mail.ru)*

**Эгамбердиев Достон**

*учитель, кафедра химии, Андижанский госуниверситет,  
Республика Узбекистан, г. Андижан*

**QUANTUM CHEMICAL INVESTIGATION OF NATURE  
OF SATURATED CARBOXYLIC ACIDS****Mukhamatdin Mamarakhmonov**

*PhD, docent, department chemistry, Andijan State University  
Republic of Uzbekistan, Andijan*

**Ibragim Askarov**

*Dr., Prof. department chemistry, Andijan State University  
Republic of Uzbekistan, Andijan*

**Shakhabiddin Kirgizov**

*Dr., Prof. department chemistry, Andijan State University  
Republic of Uzbekistan, Andijan*

**Khursida Noibjonova**

*Assistant, lecturer of department chemistry,  
Andijan State Medicinal Institute,  
Republic of Uzbekistan, Andijan*

**Doston Egamberdiyev**

*Teacher of department chemistry, Andijan State University  
Republic of Uzbekistan, Andijan*

**АННОТАЦИЯ**

В данной статье изучена природа силы у некоторых органических кислот современными методами квантовой химии. Установлены геометрия, электронное строение соединений в нейтральной и анионной форме. На основе сопоставления данных расчетов ряда кислот объяснена зависимость силы кислотности от строения гомологического ряда.

## ABSTRACT

This article has studied the nature of the acidity some organic acids using modern methods of quantum chemistry. The geometry and electronic structure of compounds in a neutral and anionic form are established. Based on a comparison of the calculation data for a number of acids, the dependence of the strength of acidity in relation to the structure of the homological series is explained.

**Ключевые слова:** карбоновые кислоты, квантово-химический расчет, геометрия, электронное строение, гомологический ряд, сила кислотности.

**Keywords:** carbonic acids, quantum chemical calculation, geometry, electronic structure, homological series, acidity.

Общеизвестно, что сила кислотности у гомологического ряда предельных органических кислот убывает с удлинением алкильного радикала. На основе экспериментальных и теоретических наблюдений ученые пришли к выводу, что кислотность, то есть легкость отщепления атома водорода в виде

протона из карбоксильной группы, зависит от природы алкильных заместителей у атома углерода кислотной группы R-COOH.

Для качественного и количественного анализа влияния алкильной группы на силу кислоты нами проведены квантово-химические расчеты соединений, представленные в схеме 1.




Схема 1.

Расчеты проведены по двум методам: DFT/B3LYP и HF с базисным набором 3-21G. Ранее нами показано [1–3], что эти подходы в полной мере удачно могут быть использованы для исследования гетероциклических и конденсированных систем, металлоценовых соединений, не говоря уже о ациклических молекулах. В процессе расчетов по программе Gaussian98 [4] были оптимизированы все

геометрические параметры структур. А полученные результаты расчетов представлены в таблице 1.

На примере первых трех членов гомологического ряда предельных карбоновых кислот нами изучены электронное строение и геометрические данные молекул.

Таблица 1.

Полные энергии ( $E_n$ ), дипольные моменты ( $\mu$ ) соединений

Соед.	DFT				HF			
	$E_n$ , а.е.	$E_n$ , Ккал/ моль	$\Delta E_n$	$\mu$ , D	$E_n$ , а.е.	$E_n$ , Ккал/ моль	$\Delta E_n$	$\mu$ , D
1	-188,69	-11841,4	0	1,273	-187,70	-117783,8	0	1,40
1a	-188,10	-118036,6	372,80	0,706	-187,10	-117410	373,724	1,46
2	-227,81	-142954,4	0	1,390	-226,53	-142152,5	0	1,65
2a	-227,21	-142578,7	375,72	2,931	-225,93	-141775,3	377,227	3,75
3	-266,92	-167492,9	0	1,249	-265,36	-166514	0	1,51
3a	-264,76	-166138,4	372,37	5,349	-264,758	-166138,4	375,644	5,35

Отрицательный заряд на атоме кислорода гидроксильной группы O2 увеличивается соответственно от муравьиной кислоты к пропионовой; а положительный заряд на атоме водорода той же функциональной группы у муравьиной кислоты имеет максимальное значение  $q(H) = +0,362e$ , нежели у уксусной и пропионовых кислот, соответ-

ственно равные  $q(H) = +0,359e$ . Межатомные расстояния у гидроксильной группы, наоборот, укорачиваются в ряду 1, 2, 3 соответственно  $d = 1\text{Å}$ ;  $0,998\text{Å}$ ;  $0,998\text{Å}$ . Не пренебрегая силой кулоновского взаимодействия с другими атомами, мы вычислили силу притяжения между атомами гидроксильной группы кислот. Согласно полученным расчетам с увеличением числа цепи метиленовых групп и абсолютное

значение кулоновской силы связи  $|F_{O-H}|$  нарастает в ряду  $1 < 2 < 3$ . Этим и объясняется тенденция трудности отщепления водорода гидроксильной группы в виде протона с ростом гомологического ряда у предельных карбоновых кислот. При этом высокая

кислотность сильнее выражена у муравьиной кислоты, имеющей наименьшую силу кулоновского взаимодействия притяжения  $|F| = 1,728 \times 10^9$  Н у гидроксильной группы.

Таблица 2.

Заряды на атомах и сила связи в гидроксильной группе соединений 1-3

Атомы	Заряды на атомах $q(e)$ , DFT/B3LYP			Заряды на атомах $q(e)$ , HF		
	1	2	3	1	2	3
O1	-0,449	-0,473	-0,479	-0,575	-0,6	-0,607
O2	<b>-0,531</b>	<b>-0,551</b>	<b>-0,556</b>	<b>-0,702</b>	<b>-0,714</b>	<b>-0,719</b>
C3	0,412	0,596	0,636	0,626	0,823	0,872
C4		-0,627	-0,485	0,414	-0,681	-0,555
C5			-0,546			-0,579
H2	<b>0,362</b>	<b>0,359</b>	<b>0,359</b>	<b>0,237</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
H3	0,206	0,226			0,25	
H4'		0,235	0,234		0,256	0,261
H4''		0,235	0,234		0,256	0,261
H5			0,207			0,224
H5'			0,207			0,224
H5''			0,189			0,207
Длина связи до-н (Å) и сила взаимодействия $F_{O-H}$ ( $10^8$ Н)						
до-н, Å	<b>1,000</b>	<b>0,998</b>	<b>0,998</b>	<b>-0,166</b>	<b>-0,293</b>	<b>-0,295</b>
$F_{O-H}$ , $10^8$ Н	<b>-1,728</b>	<b>-1,778</b>	<b>-1,794</b>	<b>-1,495</b>	<b>-2,631</b>	<b>-2,649</b>

## Список литературы:

1. Квантово-химические исследования азолов. Сообщение 3\*. Термодинамическая стабильность нейтральных молекул и интермедиатов, образующихся при электрофильном замещении азолов с тремя и четырьмя гетероатомами / Л.И. Беленький, М.Х. Мамарахмонов, А.Н. Субботин, Н.Д. Чувылкин // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2015. – № 5. – С. 1032–1035.
2. Квантово-химические исследования пиримидин-4-онов. Сообщение 3\*2-Оксо(тиоксо, селеноксо)пиримидин-4-оны и 5,6-диметил-2-оксо(тиоксо)тиено[2,3-d]пиримидин-4-оны / М.Х. Мамарахмонов., Л.И. Беленький, Н.Д. Чувылкин, М.А. Аширматов [и др.] // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2014. – № 9. – С. 350–354.
3. Квантово-химическое изучение производных ферроцена. Сообщение 1. Реакции арилирования с аминобензойными кислотами / М.Х. Мамарахмонов, Л.И. Беленький, А.М. Джураев, Н.Д. Чувылкин [и др.] // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2017. – № 4. – С. 721–723.
4. Frisch M.J. Gaussian 09, Revision A.1, Gaussian, Inc. – Wallingford CT, 2009.