




# NDM

New Day in Medicine  
Новый День в Медицине

# TIBBIYOTDA YANGI KUN

Илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал



ISSN 2181-712X.

1 (5) 2014

3. Ленишкин А.И. Хирургическая колопроктология детского возраста / М. "Медицина" 1999; 368.
4. Никифоров А. Н. Реабилитация детей с аноректальными пороками развития. /Никифоров А. Н., Аверин В. И., Дегтярев Ю. Г. и др. //Российский медицинский журнал-рецензируемый научно-практический журнал. 2005; 4:82-85. ISSN: 0869-2106
5. Holschneider A. M. Anorectal Malformations in Children: Embryology, Diagnosis, Surgical Treatment, Follow-Up / Berlin 2006; 477.
6. Pena, A Anorectal Anomalies, In Operative Pediatric Surgery /Pena, A Levitt, M. /London 2006; 479-502.
7. Puri P. Pediatric surgery /Springer Surgery Atlas Series. 2004.
8. Rintala RJ. Fecal Continence in Patients Having Undergone Posterior Sagittal Anorectoplasty Procedure for a High Anorectal Malformation Improves at Adolescence, as Constipation Disappears. /Rintala RJ, Lindahl HG. //J Pediatr Surg 2001; 36:1218-1221.

Поступила 22.12. 2014

УДК:616-071-08.697

### СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ

О.А. Хамраев, А.К. Шадманов, Д.И. Садиқова, У.М. Рустамов, Б.М. Абдурахмонов,  
Р.А. Бобоев, Б.А. Эргашев, А. Хонкелдиев

Андижанский государственный медицинский институт

✓ *Резюме,*

Проведено обследование 171 больных на основе доказательной медицины с экскреторно-токсическим бесплодием на фоне хронического простатита использование препарата "Дистрептаза" в комплексном лечении мужского бесплодия. На основании клинико-лабораторных анализов достоверно показаны фибринолитическое и протеолитическое действия с противовоспалительным действием, улучшающий микроциркуляцию в очаге воспаления с повышением концентрации антибиотиков и иммунной защиты в очаге воспаления. При данной методике значительно снижается риск развития спаечных процессов в очаге воспаления и повышается эффективность лечения.

Ключевые слова: мужское бесплодие, предстательная железа, хронический простатит, эякулят.

### ЭРКАКЛАР БЕПУШТЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

О.А. Хамраев, А.К. Шадманов, Д.И. Садиқова, У.М. Рустамов, Б.М. Абдурахмонов, Р.А. Бобоев,  
Б.А. Эргашев, А. Хонкелдиев.

Андижон давлат тиббиёт институти.

✓ *Резюме*

Сурункали простатит фонида намойён бўлаган экскретор -токсик бепуштлиқ хасталигини патогенетик ва комплекс даволашда "Дистрептаза" препаратини 171 та беморда қўллаб, унинг юқори самарадорлиги исботланди.

"Дистрептаза" препаратининг фибринолитик ҳамда протеолитик таъсири билан бир қаторда, кучли яллиғланишга қарши, шишга қарши, оғриқ қолдирувчи таъсир кўрсатади, шу билан бирга яллиғланиш ўчоғида микроциркуляцияни яхшилайди, антибиотиклар концентрациясини ҳамда ҳужайра иммун ҳимоясини кучайтиради, чандиқ ҳосил бўлиш хавфини сезиларли даражада камайтириб, даволаниш самарадорлигини оширади.

Калит сўзлар : эркаклар бепуштлиги, простата бези, сурункали простатит, эякулят.

### MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF MALE INFERTILITY

OA Khamraev, AK Shadmanov, DI Sadikova, UM Rustamov, BM Abdurahmonov, RA Bobo,  
BA Ergashev, A. Honkeldiev

Andijan state medical institute

✓ *Resume,*

Examination of 171 patients with excretory and toxic infertility against chronic prostatitis is conducted and established that use of a preparation of Distreptaza in complex treatment of man's infertility is pathogenetic reasonable and highly effective. Thanks to the proved fibrinolytic and proteolytic Distreptaza's preparation possesses expressed anti-inflammatory, antiedematous, soothing, action improves microcirculation in the inflammation center, increase concentration of antibiotics and cages of the immune are sewn up in the inflammation center considerably reduces risk of development of adhesive processes, efficiency of treatment increases.

Keywords: man's infertility prostate gland. chronic prostatitis. ejaculit.

#### Актуальность

Мужским бесплодием считается отсутствие беременности при условии регулярной половой жизни без предохранения в течение не менее 12 месяцев.

Выделяют: первичное мужское бесплодие - когда от мужчины никогда не наступало зачатия [12,13,14].

Вторичное мужское бесплодие - прежде от мужчины были случаи зачатия, причем, предыдущий факт зачатия имел место не более 3 лет назад [7, 10, 11, 19].