



Tadqiqot.UZ



# АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

1 мая, 2020 Самарканд

## МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ



**ПОБЕДИМ COVID-19  
ВМЕСТЕ!**

**CONFERENCES.UZ**





# **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ**

Материалы международной научно-практической онлайн-  
конференции

(Самарканд, 1 мая 2020 г.)

**МЕТОДЫ ВЫСОКОДОЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ  
КЛЕТОК ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ГЕМОПОЭЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С  
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА**

**Юлдашева Н.Э.**

*Андижанский государственный медицинский институт*

Вопрос оптимальных подходов к выполнению ТКПГ при ЛХ является критичным для отечественной практики и в связи с явным дефицитом трансплантационных мощностей, так как при оцениваемой потребности в 500 ТКПГ при ЛХ в год в настоящее время осуществляется лишь около 50. Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность проведения ТКПГ в условиях в Узбекистане и выявить способы улучшения результатов лечения больных с рецидивами и первично-резистентным течением ЛХ за счет оптимизации использования ТКПГ. В исследование включены 372 пациента (180 мужчин, 192 женщины), медиана возраста которых на момент ТКПГ составила 28 лет (от 11 до 57 лет). Первичная резистентность (отсутствие ремиссии после терапии I линии) имела у 132 (35,5%), ранний рецидив (рецидив в течение <12 мес. после завершения терапии I линии) - у 114 (30,6%), поздний рецидив(ы)/множественные рецидивы (спустя >12 мес. после завершения терапии I линии) - у 123 (33,1%) пациентов. У 3 больных (0,8%) ТКПГ была проведена в качестве консолидации первой полной ремиссии (больные включены только в анализ безопасности ТКПГ). При медиане наблюдения за живущими больными, составившей 51 мес. (от I до 218 мес.), и исключении из анализа 3 пациентов, получивших ТКПГ в качестве консолидации первой полной ремиссии, 5-летняя ОВ составила  $65 \pm 2,8\%$ , 10-летняя -  $50,5 \pm 2,9\%$ . Пятилетняя выживаемость РРТГ, составила  $52,6 \pm 2,8\%$ , 10-летняя -  $50,3 \pm 3,0\%$ . Ранняя посттрансплантационная (100-дневная) летальность, рассчитанная для всех 372 пациентов, составила 3,8% (14 больных). Среди 266 пациентов с известным гистологическим подтипом опухоли преобладал нодулярный склероз - 161 (60,5%) больной и смешанно-клеточный подтип ЛХ - 81 (30,5%) пациент. В дебюте заболевания 1П-1У стадия заболевания была у 157 (51,4%) из 305 больных, у которых этот показатель был известен, В-симптомы присутствовали у 163 (53,4%) из 305 оцениваемых пациентов. При рестадировании (было проведено у 304 больных) перед принятием решения о ТКПГ распространенные стадии болезни имели 179 (52,4%) больных, В-симптомы на этот момент имелись у 146 (48,7%) больных из 300, у которых этот показатель был оценен. По этим параметрам исследуемая группа в целом соответствовала характеристикам больных, включаемых в зарубежные исследования по ТКПГ при ЛХ. Однако исследуемая популяция оказалась значимо «обогащена» больными с первично-резистентным течением заболевания - 132 (35,8%) и пациентами с рецидивами, резистентными к ранее проводившейся терапии II линии - 81 (34,2%) из 237 больных с рецидивами. По данным регистра ЕВМТ, в трансплантационных центрах Европы доля больных с первично-резистентным течением или резистентными рецидивами в 1990-е не превышала 25% и снизилась до 10-15% в последующем. ТКПГ при ЛХ, выполняемая в отечественных трансплантационных центрах, обладает высокой эффективностью и удовлетворительной переносимостью: 5-летняя ОВ -  $65 \pm 2,8\%$ , РРТГ -  $52,6 \pm 2,8\%$ . Ранняя посттрансплантационная (100-дневная) летальность составляет 3,8%. Совершенствование сопроводительной терапии и использование КПГ ПК привело к существенному снижению ранней посттрансплантационной летальности при сохранении высокой эффективности ТКПГ.

Ключевые слова: химиотерапия, посттрансплантационная летальность, лимфомы Ходжкина.