

электронное периодическое издание

# ЭКОНОМИКА

и

*социум*

ISSN 2225-1545

№10(77)-2020



ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

# «*Экономика и социум*»

<http://www.iupr.ru>

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

*ISSN 2225-1545*

Свидетельство о регистрации  
средства массовой коммуникации  
Эл № ФС77-45777  
от 07 июля 2011 г.

***Редакционный совет:***

*Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор,  
Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент,  
Смирнова Т.В., доктор социологических наук, профессор,  
Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор,  
Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор,  
Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент*

**Отв. ред. А.А. Зарайский**

Выпуск №10(77) (октябрь, 2020). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© *Институт управления и социально-экономического развития, 2020*

Холикова Д.С., ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАННЕЙ МАНИФЕСТАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДГИПЕРТЕНЗИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.....	848
Холмуродова Э.Х., КОГНИТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ .....	852
Хомидов И.И., Махаматова С.Х., Раззаков Н.А., КРАУН-ЭФИРЫ: СТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ.....	856
Хомидов И.И., БИОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ .....	860
Худойкулов Р.К., Нарзуллоев А.Ш., МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ С НАУЧНЫМИ ГРАФИЧЕСКИМИ ПРОГРАММАМИ ПО ЧЕРТЕЖУ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ .....	864
Цзян Ин, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	867
Цзян Ин, ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	872
Чжан Кай, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ И ЕЕ СУЩНОСТЬ.....	879
Чжан Кай, СУЩНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ .....	885
Чжао Синь, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ.....	891
Чжао Синь, УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ.....	897
Шадманова Г., Абдуллаев З.С., Рахманкулова Б.О., ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА .....	905
Шайхисламов Н., ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА В СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ.....	911
Шарипов Б.Х., ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРҚ СРЕДНЕЙ АЗИИ .....	915
Шерматов Б.Э., ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	920
Шитова И.А., ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ .....	923
Шкерина К.С., ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА РАБОТНИКОВ КАЧЕСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА.....	929

*Хамидов И.И., кандидат химических наук  
доцент*

*Андижанский Государственный медицинский институт  
Узбекистан, г. Андижан*

*Махаматова С.Х.  
ассистент*

*Андижанский Государственный медицинский институт  
Узбекистан, г. Андижан*

*Раззаков Н.А.  
ассистент*

*Андижанский Государственный медицинский институт  
Узбекистан, г. Андижан*

## **КРАУН-ЭФИРЫ: СТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ**

*Аннотация: Краун-эфиры, с химической точки зрения, являются гетероциклическими соединениями. Своёобразие краун-эфиров заключается в том, что они способны образовать циклические макромолекулы с различными атомами. В данной статье приведены некоторые свойства и области применения как синтетических, так и природных краун-эфиров.*

*Ключевые слова: химия, краун-эфиры, соединения, алкалоиды, растения, физиологически активные, гетероциклические, циклические макромолекулы, синтетические, природные, бензилизохинолины.*

*Khamidov I.I., Phd of Chemistry  
Andijan Region State Medical Institute  
Uzbekistan, Andijan  
Maxamatova S.H.  
assistant*

*Andijan Region State Medical Institute  
Uzbekistan, Andijan  
Razzaqov N.A.  
assistant  
Andijan Region State Medical Institute  
Uzbekistan, Andijan*

## **CROWN ETHERS: STRUCTURES AND APPLICATIONS**

*Abstract: Crown ethers, from a chemical point of view, are heterocyclic compounds. Their originality lies in the fact that they are able to form cyclic*

*macromolecules with various atoms. This article presents some properties and applications of both synthetic and natural crown ethers.*

*Keywords: chemistry, compounds, crown ethers, alkaloids, plants, physiologically active, heterocyclic, cyclic macromolecules, synthetic, natural, benzilzohinolines.*

Вопрос изучения закономерностей химического поведения основных классов гетероциклических: как синтетических, так и природных соединений во взаимосвязи с их строением остается актуальной задачей биоорганической химии.

По химической структуре все краун-эфиры относятся к классу гетероциклических соединений, однако разнообразные физические и химические свойства, а также физиологические действие этих соединений позволили выделить их в самостоятельный класс соединений. Характерное свойства этих краун-эфиров образовывать комплексные соединения с многими металлами за счет неподелённых электронных пар гетероатомов.

В последнее время всё чаще появляется информация о синтезе и применении синтетических краун-эфиров. В частности, авторами приведены синтез эффективного наноматериала, введением наножелеза ( $Fe^0$ ) в полость олигомерного краун-эфира. Им установлено, что полученное соединение улучшает реологические свойства нефти: уменьшение вязкости, отделение воды и механических примесей от нефти, уменьшение удельной массы нефти [1].

В современной медицине часто появляются данные о макроциклических лигандах – краун-эфиров как противотоксичных средств. Способность макроциклических соединений строго избирательно, в соответствии с устройством своей внутримолекулярной полости, захватывать и удерживать определенные ионы делает их высокоэффективными специфическими экстрагентами: с их помощью можно выводит из организма попавшие в него радиоактивные вещества или токсичные тяжелые металлы. Многие макроциклические соединения обладают антимикробными, антипаразитарными свойствами, способны регулировать работу сердца, предотвращая аритмию и фибрилляцию.

В растениях, природные краун-эфиры специфически связываясь с щелочными и щелочноземельными металлами, которые играют решающую роль в функционирование ферментов, открывают большие возможности для управления состоянием растительного организма.

Нами было исследованы различные органы растений рода *Verbeis*. Во время исследования алкалоидного состава *Verbeis* нами было выделено и установлено строение нейтрального, циклического соединения цикловератрилена (I).

Из эфирной суммы молодых побегов *V.turcomanica* выделено нейтральное вещество I. Для определения структуры I проведено

рентгеноструктурный анализ и установлено, что соединение I является циклотривератриленом (ЦТВ).

Соединение I дает положительную реакцию с реактивом Драгендорфа, которое характерно для азотсодержащих соединений.



В масс-спектре имеются пики ионов с  $m/z$  450 (30), 449(100), 435 (25), 419 (80), 299 (95), 151 (50). В УФ-спектре присутствуют максимумы поглощения в области 234 и 296 нм. В ИК-спектре отсутствуют полосы поглощения, соответствующие гидроксильной и карбонильной группе.

В ПМР-спектре обнаружены четыре группы сигналов: в ароматической области - синглет при 6.80 м.д., два дублета от метиленовых протонов при 4.69 и 3.46 м.д. ( $J=14$  Гц) и синглет от метоксильной ( $OCH_3$ ) группы при 3.76 м.д. с соотношением интенсивностей 2:1:1:6. Такая групповая эквивалентность протонов свидетельствует о высокой симметричности соединения I.

Это же подтверждает ЯМР  $^{13}C$ -спектр I, в котором имеется только пять сигналов для углеродных атомов. Для определения структуры I проведено рентгеноструктурный анализ и установлено, что соединение I является природным краун-эфиром - циклотривератриленом, пространственное строение которого изучено рентгеноструктурным анализом. Отнесение сигналов в спектре ЯМР  $^{13}C$ : 113,0 (д, C-2), 147.6 (с, C-3), 132.7 (с, C-6), 36.3 (т, C-7), 55.9 (к,  $OCH_3$ ).

Известно, что циклотривератрилен в лабораторных условиях получается конденсацией вератрола с формальдегидом или из вератрилового спирта при нагревании с концентрированными кислотами. Однако окончательная структура для циклотривератрилена установлена намного позднее [2]. Поскольку при экстракции сырья - молодых побегов *V. thibetanicus* и разделении смеси алкалоидов нами не применялось концентрированные кислоты, считаем что ЦТВ является нативным соединением, впервые выделенным из растения.

Вероятно, биосинтез I и II идет в растении параллельно из общего предшественника. Однако, не исключено, что I является конечным продуктом превращений бензилизохинолиновых алкалоидов, так как имеются сведения о получении циклотривератрилена при окислении бензилизохинолинового алкалоида - лауданозина [3].



#### Использованные источники:

1. Шабанов А.Л. и др. Комплексы наножелеза с краун-эфирами – эффективные регуляторы улучшения реологических свойств нефтей. // Журнал «Нефтепромышленное дело». – 2014. - № 4. – 60-62 стр.
2. Lindsey A. The structure of Cyclotrimeratrilene and Related Compounds // J. Chem. Soc. - 1965. - P. 1685-1692.
3. Goldup A., Morrison A.B., Smith G.W. The Structure of Cyclohexatril. J. Chem. Soc. - 1965. - P. 3864-3865.